

CAPITULO 7

FÁRMACOS QUE PUEDEN CAUSAR SÍNTOMAS PSIQUIÁTRICOS

M.Valsecia - L. Malgor

Muchos fármacos frecuentemente utilizados pueden producir síntomas mentales graves entre los que se incluyen: depresión y trastornos que pueden semejar esquizofrenia. Estos efectos adversos pueden estar relacionados con la dosis o pueden ser idiosincrásicos.

Los síntomas psiquiátricos que aparecen mientras los pacientes toman un fármaco desaparecen normalmente al suspender el tratamiento, pero algunos compuestos pueden ocasionar síntomas al interrumpir su administración. La suspensión del alcohol o sedantes pueden producir psicosis de abstinencia en aquellos pacientes que ingresan al hospital. Con algunos fármacos de acción prolongada como el diazepam, las reacciones de abstinencia pueden aparecer más tardíamente.

Algunos síntomas psiquiátricos pueden ser causados por el fármaco o por el proceso patológico. Los pacientes con lupus eritematoso diseminado pueden desarrollar síntomas psiquiátricos debido a la cerebritis lúpica o al corticoide utilizado para tratar la enfermedad; la situación clínica determinará si debe aumentarse o reducirse la dosis del fármaco. Muchos medicamentos pueden ocasionar ataques de porfiria y asociarse a síntomas psiquiátricos.

En la tabla siguiente se enumeran fármacos que pueden ocasionar síntomas psiquiátricos. No se incluye el alcohol y alucinógenos o interacciones entre drogas que pueden ocasionar síntomas psiquiátricos..

Fármacos	Reacciones	
Aciclovir, ganciclovir	Alucinaciones, temores, confusión, insomnio, hiperacusia, paranoia, depresión	A dosis altas, especialmente en pacientes con IRC.
Alprazolam y otras benzodiazepinas	Amnesia, confusión mental, comportamiento agresivo, excitación psíquica, paranoia, depresión, pesadillas, manía.	Durante el tratamiento o en la abstinencia, más frecuente en ancianos
Amantadina	Alucinaciones visuales, ilusiones paranoicas, pesadillas, manía, exacerbación de la esquizofrenia	Más frecuente en ancianos
Amfotericina B	Delirio	Con uso I.V. o intratecal
Acido aminocaproico	Delirio agudo alucinaciones	Después de administrar inyección i.v. en dosis alta
Amiodarona	Delirio alucinaciones	
Antidepresivos tricíclicos	Delirio tipo atropínico	
Anabólicos esteroides	Agresión, manía, depresión, psicosis	
Amfetamínicos	Conducta extravagante, alucinaciones, paranoia, agitación, ansiedad, síntomas maníacos, depresión.	Generalmente con sobredosis y abuso. También en casos de abstinencia
Anticolinérgicos	Confusión, amnesia, desorientación, despersonalización, delirio, alucinaciones auditivas y visuales, temor, paranoia, agitación, conducta extravagante. Habla incoherente.	Sobre todo en niños y ancianos en dosis altas. También fue comunicado con escopolamina transdérmica
Anticonceptivos orales	depresión	
Anticonvulsivos	Agitación, confusión, delirio, depre-	Con dosis altas o picos plas-

	sión, psicosis, agresividad, manía, encefalopatía tóxica.	ma'ticos elevados
Antihistamínicos	Alucinaciones	Con sobredosis
Antiinflamatorios no esteroides	Paranoia, depresión, confusión, ansiedad, desorientación y alucinaciones	
Atenolol, propranolol, etc	Depresión, insomnio, confusión, pesadillas, alucinaciones, paranoia, delirio, manía, hiperactividad.	Con dosis normales, incluso con el uso oftálmico.
Biperideno (Akinetón)	Confusión, amnesia, desorientación, despersonalización, delirio, alucinaciones auditivas y visuales, temor, paranoia, agitación, conducta extravagante. Habla incoherente.	
Bromocriptina	Manía, delirio, paranoia, alucinaciones, conducta agresiva, recaída esquizofrénica, ansiedad.	No relacionado con la dosis y puede persistir durante semanas después de suspender el tratamiento.
Buprenorfina y opiáceos	Pesadillas, ansiedad, agitación, euforia, disforia, depresión, paranoia y alucinaciones	Generalmente con dosis altas
Buspirona (Bespar)	Delirio, manía, ataques de pánico	
Captopril, enalapril, etc.	ansiedad grave, alucinaciones, insomnio, manía	En pacientes deprimidos
Carbamacepina	Agitación, confusión, delirio, depresión, psicosis, agresividad, manía, encefalopatía tóxica.	
Cefalosporinas	Confusión, desorientación paranoia, alucinaciones	
Ciclosporina	Alucinaciones manía	
Cimetidina, ranitidina, Famotidina	Confusión, alucinaciones	
Ciprofloxacina y otras quinolonas	Delirio, psicosis	
Clomifeno	Síntomas de esquizofrenia, paranoia	
Clonidina, alfa metil dopa	delirio, alucinaciones, depresión, amnesia, pesadillas, psicosis	
Clorambucil	Alucinaciones, letargia, convulsiones, estupor	con dosis altas
Cloroprocaína y procaína	Alucinaciones, convulsiones, delirio, depresión, pánico	
Clozapina	Delirio	Puede evitarse dando lentamente la dosis
Corticoides	manía, depresión, confusión, paranoia, alucinaciones, catatonía	
Dapsona	Insomnio, agitación, alucinaciones, manía, depresión	
Digitálicos	Pesadillas, confusión, paranoia, depresión, alucinaciones visuales	Con dosis altas y en ancianos
Diltiazem, Nifedipina	Depresión, ideas suicidas, irritabilidad, pánico.	
Flecaínida	Alucinaciones visuales	
Fluoxetina	Manía, hipomanía, despersonalización	
Gentamicina, y otros amonoglucósidos	Confusión, desorientación, alucinaciones	

Interferón	Delirio, paranoia, depresión, ansiedad, ideas suicidas	
Iodoexol	Confusión, desorientación	
Isocarboxazida	Manía insomnio, ansiedad, delirio paranoico	
Isoniazida	Agitación, paranoia, depresión, ansiedad.	
Dinitrato de isosorbide	Alucinaciones, depresión, ideas suicidas	
Isotretinoína	Depresión	
Ketoconazol	Confusión, alucinaciones	
LevoDOPA	delirio, depresión, agitación, pesadillas, terror nocturno, alucinaciones, paranoia	Frecuente con uso prolongado y en ancianos
L-Glutamina	Grandiosidad, hiperactividad, hipersexualidad	En sexo masculino
Lovastatina, pravastatina	Depresión	
Metoclopramida	Manía, depresión grave, llanto, delirio	
Metronidazol	Depresión, agitación, llanto incontrolable, desorientación, alucinaciones	
Misoprostol	Delirio	
Ac. Nalidíxico	Confusión, depresión, alucinaciones	
Naloxona	Conducta violenta	
Podofilina	Delirio, paranoia, conducta extravagante	Uso oral en niños y tópico en adultos
Politiazidas y otros diuréticos	Depresión, ideación suicida	
Prazosin	Alucinaciones, depresión, paranoia	
Quinidina	Confusión	
Reserpina	Depresión, pesadillas	
Salbutamol	Alucinaciones, paranoia	
Sulfas y TMPS	Confusión, desorientación, depresión, euforia, alucinaciones, psicosis	
Tamoxifen	delirio	
Teofilina	Delirio, abstinencia, hiperactividad, mutismo, ansiedad, manía	
Tiabendazol	Psicosis	
Hormonas tiroideas	Manía, depresión, alucinaciones, paranoia	
Trazodona	Delirio, alucinaciones, paranoia, manía	
Vincristina	Alucinaciones	
Zidovudina AZT	Manía, paranoia, alucinaciones	